



# Chico mamey



<b>FOLIAR</b>	Se puede mezclar con la mayoría de los productos usados. No mezclar con ácidos o productos altamente alcalinos.
<b>AL SUELO</b>	Se puede complementar con BIOFERT®, fertilizantes químicos, compostas, lombricompostas, etc. Evite mezclar con ácidos o cal.

**IMPORTANTE:** Todas estas aplicaciones deberán hacerse con la planta bien hidratada.

## Recomendaciones para aplicar los productos de BIO-BARO:

En riego de gravedad:

Aplicación No.	Tipo de Aplicación	Periodo de Aplicación	Dosis (5 L / 1000 L DE AGUA)
1	AL CAJETE	En la fertilización de prefloración.	6 L de esta solución por árbol
2	FOLIAR	Prefloración	2-3
3	FOLIAR	En cerillo	2-3
4	EN RIEGO	En canica	6 L de esta solución por árbol
5	EN RIEGO	Al inicio de llenado	6 L de esta solución por árbol

Aplicación No.	Tipo de Aplicación	Periodo de Aplicación	Dosis (L/ha)
1	EN RIEGO	En la fertilización de prefloración	5
2	FOLIAR	Prefloración	2-3
3	FOLIAR	En cerillo	2-3
4	EN RIEGO	En canica	5
5	EN RIEGO	Al inicio de llenado	5

## NOTAS: