



Jitomate y Chile en invernadero



Recomendaciones para aplicar los productos de BIO-BARO:

| Producto | Problema | Periodo de Aplicación | Dosis: (L/ha) |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| BEMEDEEN | HONGOS Y BACTERIAS | Desinfección de plántula, inmersión | 1 x 100 de agua |
| | CENICILLA Y BACTERIAS | Primeros síntomas | 2 |
| BIO TRICO | HONGOS EN EL SUELO | Cada 2 meses en el sistema | 2 |
| BIOATRAX | MOSCA BLANCA Y CHUPADORES | Primeros síntomas | 1-2 |
| BIO BAS | TROZADORES DEL FRUTO | Primeros síntomas | 1-2 |
| BIO CALE | MOSCA BLANCA Y CHUPADORES | Primeros síntomas | 1-2 |

NOTAS:

| | |
|-----------------|---|
| FOLIAR | Es recomendable hacer aplicaciones foliares de GUANOFOL® juntamente con insecticidas de control, fertilizantes foliares y hormonas. Fungicidas y bactericidas se recomienda aplicarlos por separado. En caso de alta incidencia de enfermedades fúngicas o bacteriológicas, suspender GUANOFOL® en aplicaciones foliares. |
| AL SUELO | Se puede complementar la nutrición con BIOFERT®, fertilizantes químicos, compostas, lombricompostas, etc. No mezclar con ácidos o productos altamente alcalinos. |

IMPORTANTE: Todas estas aplicaciones deberán hacerse con la planta bien hidratada.